

# HOW LONG TO STAY HOME WHEN YOU, OR YOUR CHILD ARE SICK

## Whooping Cough

Until 5 days after beginning of antibiotic treatment or until 3 weeks have passed since onset of illness.

## Runny nose with green or yellow discharge

Until discharge is clear.

## Vomiting and Diarrhea

48 hours after last episode.

## Impetigo

Until the antibiotic prescribed by a doctor has been taken for at least 24hrs or until sores are completely scabbed over.

## Unidentifiable Skin Rash

Until identified and proper procedure followed.

## Cough

At least 5 days after symptoms start.

## Pink Eye

Until the antibiotic prescribed by a doctor has been taken for at least 24hrs.

## Rubella

At least 7 days after first rash appears.

## Measles

For at least 4 days after the rash appears.

## Runny or Watery Eyes

Until symptoms subside.

## Chicken Pox

Until rash and blisters crust over usually around 10 to 21 days.

## Fifth Disease

Until your child is feeling well enough to participate normally in all activities.

## Flu (Influenza)

5 days after the onset of symptoms OR until fever-free and feeling better, whichever is shorter.

## Strep throat

24hrs after treatment begins.

## Ringworm

Until treatment has been initiated.

## Fever


Fever-free for 24 hours

## Hand, Foot and Mouth

Until your child is feeling well enough to participate normally in all activities. Those with mouth sores or oozing lesions should stay away from others.

Please note, if any of our staff notices you or your child with these symptoms, you will be asked to come back at a later date when you are symptom free.

FOR MORE  
INFORMATION  
PLEASE VISIT THE  
EOHU WEBSITE



# COMBIEN DE TEMPS RESTER à LA MAISON LORSQUE VOUS OU VOTRE ENFANT ÊTES MALADE

## Coqueluche

Jusqu'à 5 jours après le début du traitement antibiotique ou jusqu'à 3 semaines après le début de la maladie.

## Nez qui coule avec écoulement vert ou jaune

Jusqu'à ce que la décharge soit claire.

## Vomissements et diarrhée

48 heures après la dernière épisode.

## Impétigo

Jusqu'à ce que votre enfant ait pris l'antibiotique prescrit pendant au moins 24 heures ou jusqu'à ce que les plaies soient complètement recouvertes de croûtes.

## Éruption cutanée non identifiable

Jusqu'à ce que la procédure soit identifiée et appropriée.

## Toux

Au moins 5 jours après le début des symptômes.

## Conjonctivite

Jusqu'à ce que votre enfant ait pris l'antibiotique prescrit pendant au moins 24 heures.

## Rubéole

Au moins 7 jours après l'apparition de la première éruption cutanée.

## Rougeole

Pour au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption cutanée.

## Yeux qui coulent ou larmoyants

Jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.

## Varicelle

Jusqu'à ce que l'éruption cutanée et les cloques se forment généralement autour de 10 à 21 jours.

## Cinquième maladie

Jusqu'à ce que votre enfant se sente suffisamment bien pour participer normalement à toutes les activités.

## Grippe

5 jours après l'apparition des symptômes Où jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fièvre et que vous vous sentiez mieux, selon la période la plus courte.

## Angine streptococcique

24 heures après le début du traitement.

## Teigne

Jusqu'à ce que le traitement ait été initié.

## Fièvre

Sans fièvre pendant 24 heures

## Mains, pieds et bouche

Jusqu'à ce que votre enfant se sente suffisamment bien pour participer normalement à toutes les activités. Ceux qui ont des plaies dans la bouche ou des lésions suintantes doivent rester à l'écart des autres.

Veuillez noter que si un membre de notre personnel remarque que vous ou votre enfant se présente avec des symptômes. Nous sommes dans l'obligation de vous demander de revenir à un autre moment et lorsque vous n'aurez plus de symptômes.

*POUR PLUS  
D'INFORMATIONS,  
VEUILLEZ VISITER  
LE SITE WEB DU  
BSE0*

